

Impfungen: Übersicht Nebenwirkungen und Kontraindikationen

Gelbfieber (Stamaril®):

Sehr häufig: Kopfschmerz, Lokalreaktion. **Häufig:** grippeähnliche Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. **Gelegentlich:** Bauchschmerz. **Selten:** allergische Reaktionen. **Sehr selten:** Hirnhautentzündung, Guillain-Barré-Syndrom, Krämpfe, Leberversagen, Nierenversagen, Atemstillstand, in Einzelfällen mit Todesfolge.

Gegenanzeigen: Hühnereiweiß-Allergie, Kinder < 9 Monate, Schwangere und Stillende, fortschreitende bösartige Erkrankungen, Immunsuppression und Immundefekt, nach Chemo- und Strahlentherapie, Thymuserkrankung.

Tollwut (Rabipur®, Tollwut-Impfstoff-HDC®):

Sehr häufig: Lokalreaktion, Übelkeit, Schwindel, Muskelschmerz. **Häufig:** Ausschlag, Fieber, Lymphknotenschwellung, Gelenkschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, grippeähnliche Beschwerden. **Selten:** Sehstörungen, Gefühlsstörungen. **Sehr selten:** allergische Reaktion, Enzephalitis Krampfanfall, Guillain-Barré-Syndrom.

Gegenanzeigen: Allergie gegen Neomycin oder Hühnereiweiß (Rabipur®).

Hirnhautentzündung durch Meningokokken (Nimenrix®, Menveo®):

Sehr häufig: Lokalreaktion, Kopfschmerz, Übelkeit, Müdigkeit, Fieber. **Häufig:** Magen-Darm-Beschwerden, Schüttelfrost, Ausschlag. **Gelegentlich:** Schwindel, Muskelschmerzen, Gefühlsstörung

Gegenanzeigen: Schwangerschaft, Überempfindlichkeit auf Tetanus/Diphtherietoxoid/ Saccharose/Trometamol.

Typhus (Typhim Vi®):

Sehr häufig: Lokalreaktionen, leichtes Fieber, grippeähnliche Beschwerden. **Selten:** Magen-Darm-Beschwerden. **Sehr selten:** allergische Reaktionen, Asthmaanfall. **Gegenanzeigen:** Allergie gegen Phenol. Abzuwägen bei: Schwangerschaft/Stillzeit.

Japanische Enzephalitis (Ixiaro®):

Sehr häufig/häufig: Lokalreaktion, grippeähnliche Beschwerden, Fieber, Ausschlag, Übelkeit. **Gelegentlich:** Entzündung in Hals, Nase, Rachen, Migräne, Schwindel, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerz, Schüttelfrost, erhöhte Leberenzymwerte, Lymphknotenschwellung, Kurzatmigkeit, allergischer Hautausschlag. **Selten:** Juckreiz, Thrombozytopenie, Gefühlsstörungen, allergische Reaktion, Palpitationen, Herzrasen, periphere Ödeme.

FSME (FSME-IMMUN® Erwachsene/ -0,25ml Junior®):

Häufig: Lokalreaktion, Fieber, Kopf-/Gelenk-/Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Missempfindungen. **Gelegentlich:** Erbrechen. **Einzelfälle:** Schwindel, Nervenentzündung, Guillain-Barré-Syndrom, Meningismus, Enzephalitis, Krämpfe, Sehstörungen, Gangunsicherheit, Tachykardie, allergische Reaktion, Verstärkung von Autoimmunerkrankungen.

Gegenanzeigen: Allergie: Hühnereiweiß, Neomycin, Latex. Abzuwägen bei: Gehirnerkrankungen, Schwangere/Stillenden.

Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis und Keuchhusten (Boostrix Polio®, Repevax®):

Sehr häufig: Lokalreaktion, Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Temperaturerhöhung, Ausschlag. **Häufig:** Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gelenk- und Muskelschmerzen. **Gelegentlich:** Konjunktivitis, Atemwegsinfekt, Magen-Darm-Beschwerden. **Sehr selten:** Fieber $\geq 39,9^{\circ}\text{C}$. **Einzelfälle:** allergische Reaktionen, Atemnot, Krampfanfälle, neurologische Erkrankungen (Guillain-Barré, Neuritis, Schwindel).

Pneumokokken (Pneumovax®, Prevenar 13®):

Sehr häufig (Prevenar®): Appetitlosigkeit, Fieber, Reizbarkeit, Schläfrigkeit/Schlafstörung. **Häufig:** Lokalreaktion. **Gelegentlich (Prevenar®):** Erbrechen, Durchfall. **Selten:** Fieber, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopf-/Muskel-/Gelenkschmerzen, Lymphgefäßentzündung, (Prevenar®: Allergische Reaktion, Krampfanfälle). **Sehr selten:** Thrombozytopenie. **Einzelfälle (Pneumovax®):** Neuritis, Guillain-Barré-Syndrom, allergische Reaktionen, Schüttelfrost, Ödeme. **Gegenanzeigen:** Schwangerschaft.

Hepatitis B (Engerix B®) Hepatitis A (Havrix 1440®, HAVpur®) Hepatitis A und B (Twinrix®):

Sehr häufig: Kopfschmerz, Reizbarkeit. **Häufig:** Lokalreaktion, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schläfrigkeit. **Gelegentlich:** Schwindel, Erbrechen, Muskelschmerzen, Fieber, Atemwegsinfekt. **Selten:** Abgeschlagenheit, Fieber, Frösteln, Kopf-/Gliederschmerzen, Gefühlsstörungen, Hautausschlag, niedriger Blutdruck. **Sehr selten:** Leberwerterhöhung, **Ausschlag.** **Einzelfälle:** Thrombozytopenie, Neuritis/Enzephalitis/Meningitis, Lähmungen, Krampfanfälle, allergische Reaktionen, Vaskulitis, Leberwerterhöhung. **Gegenanzeigen:** Neomycin-Allergie.

Cholera (Dukoral®):

Gelegentlich: Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerz. **Selten:** Fieber, Schwindel, Atemwegsbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit. **Sehr selten:** Dehydratation, Schläfrigkeit, Ohnmacht, Geschmackstörung, Schwitzen, Ausschlag, Gelenkschmerzen, Frösteln. **Einzelfälle:** Gefühlsstörungen, allergische Reaktion, Asthenie, hoher Blutdruck.

Gegenanzeigen: akute Magen-Darm-Erkrankungen. 1 Stunde vor und nach Impfung nicht essen und trinken.

Masern-Mumps-Röteln (MMRvaxPro®):

Häufig: Ausschlag, Lokalreaktion, Fieber. **Gelegentlich:** Atemwegsinfekt, virale Infekte, Schnupfen, Erbrechen, Durchfall, Ausschlag. **Einzelfälle:** atypische Masern, Meningitis/Enzephalitis, Krampfanfälle, subakute sklerosierende Panenzephalitis, Epididymitis, Orchitis, Mittelohrentzündung, Parotitis, Thrombozytopenie, allergische Reaktion, Ödeme, Ataxie, Benommenheit, Guillain-Barré-Syndrom, Augenmuskellähmung, Neuritiden, Augen/Netzhautentzündung, Taubheit, Bronchospasmus, Lungenentzündung, Arthritis, Vaskulitis. **Gegenanzeigen:** akute behandlungsbedürftige Erkrankungen, Immunschwäche, Schwangerschaft (und 3 Monate davor), Neomycin-Allergie, Fructose-Intoleranz. Alter < 9 Monate.

Gürtelrose (Shingrix®):

Sehr häufig: Lokalreaktionen, Fieber, Müdigkeit, Muskel-/Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden.

Gegenanzeigen: Unverträglichkeit gegen Adjuvans AS01B/Saccharose, Schwangerschaft/Stillzeit

(Sehr häufig: > 10%. Häufig: 1%-10%. Gelegentlich: 0,1% bis 1%. Selten: 0,1% bis 0,01%. Sehr selten: < 0,01%)